



동물용의약품

똥 똥리는 강력 소화제
깔끔하게 하나로

리버빌 주사

식이성 소화기 질병 예방 및 치료

- 만성 소화불량
- 고창증

소화기능 강화

- 담즙분비 촉진
- 소화액 분비 촉진

간장 질병 예방 및 치료

식욕 증진 효과



원료약품 및 분량 본제 1mL 중

• 멘부톤 (Menbuton)	100mg
• 클로로크레솔 (Chlorocresol)	2mg
• 피로아황산나트륨 (Sodium Pyrosulfite)	2mg
• 에데트산 (Edetic acid)	2mg
• 디에탄올아민 (Diethanolamine)	적당량
• 주사용수 (Water for Injection)	적당량

효능 및 효과

아래 가축의 식이성 소화기 질병 및 간장 질병의 예방, 치료

가. 소 (젖소, 비육우, 송아지)

- 사료의 급변, 과식, 임신중독, 질병, 난산 및 수송 등과 관련하여 발생하는 변비, 식욕감퇴, 만성소화불량, 고창증, 제1위 마비, 식체, 제4위 확장, 위장관염, 설사 등의 소화기 장애
- 유행열, 지방간, 간염 등의 간장의 이상 영양, 중독이나 기생충 감염에 따른 간장 손상의 간장 질병의 보조적 치료
- 유열, 케토시스, 허약, 유 생산 감소, 병후 또는 수술 후 회복기의 식욕 증진 효과

나. 돼지 (모돈, 자돈)

- 식욕부진, 변비, 과식 또는 사료변경에 따른 소화기 장애, 부종병, 간장질환, 병후 또는 수술 후 회복기의 식욕증진

다. 말

- 식이성 변비, 과식이나 사료변경에 따른 소화기 장애, 간장질환, 병후 또는 수술 후 회복기의 위장관 기능의 회복

라. 양

- 초기 임신 중독증, 중독에 따른 간장 손상의 보조적 치료

마. 개

- 변비, 간염, 간장 또는 체장의 기능 손상 및 부적절한 식이로 인한 소화기 장애, 병후 또는 수술 후 회복기의 식욕증진

용법 및 용량

일반적으로 가축의 체중 kg당 본제 0.05~0.1mL를 근육 또는 정맥 내 주사한다.

가. 소 : 20~40mL / 송아지 : 5~15mL

나. 성돈 : 10~20mL / 자돈 : 체중 kg당 0.1mL

다. 말 : 20~30mL (정맥 내 주사)

라. 양 : 5~6mL

마. 개 : 체중 kg당 0.1mL (근육 내 주사)

저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 직사광선을 피하여 건조한 1~30°C에 보관
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월



품질관리 우수업체

한 동

서울 송파구 오금로 535 한동빌딩
소비자상담전화 : 02-406-3511